

2012-0207  
2012-01-12

Spray-Pak

INSECTICIDE POUR MAISON

Sous pression à appliquer aux surfaces et dans l'air

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| GARANTIE: d-trans alléthrine | 0,25% |
| Butoxyde de pipéronyle       | 1,00% |

NO. D'HOM. 22809 LOI P.A.



ATTENTION      EXPLOSIF

CONTENU NET 350g

K-G Spray-Pak Inc.  
8001 Keele Street  
Vaughan, Ontario  
L4K 1Y8  
905 669-9855

MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT USAGE. Tenir le contenant à la verticale pour vaporiser.

**POUR DÉTRUIRE LES INSECTES DOMESTIQUES:**

Insectes volants - Mouches, moustiques, guêpes, moucheron, papillons de nuit. Fermer les portes et les fenêtres. Diriger le jet de vaporisation vers le haut en mouvements de va-et-vient, dans toutes les directions de la pièce, particulièrement vers les fenêtres et les autres sources de lumière. Appliquer un jet de 6-10 secondes dans un espace de 30 m<sup>3</sup>. Après chaque traitement, dans la mesure du possible, garder les portes et les fenêtres fermées pendant 25 minutes. Appliquer également un jet de vaporisation dans les endroits où les insectes sont présents. Garder le jet de vaporisation à une distance minimale de 1 mètre des murs intérieurs, tissus et meubles. Bien aérer la salle après traitement.

Insectes rampants - blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, centipèdes, lépismes argentés. Vaporiser dans les endroits dissimulés préférés des insectes, comme les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, les tuyaux et les conduits, derrière les armoires et dans les lieux d'entreposage. Vaporiser les sentiers de fourmis, la fourmilière, les seuils de portes et les cadres de fenêtres. Le contact de l'insecticide avec les insectes est nécessaire pour assurer leur destruction.

Punaises - Vaporiser le matelas, particulièrement autour des coutures et des touffes. Démonter le lit et vaporiser tous les assemblages. Répéter l'application au besoin.

Puces - Vaporiser l'endroit où dorment les animaux. Changer la litière si nécessaire. Ne pas utiliser sur les animaux.

**PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, le jeter au feu ni le garder à des températures supérieures à 50°C. Pendant la vaporisation des pièces, recouvrir les aquariums et sortir les animaux pendant une heure. Retirer ou recouvrir tous les aliments et ustensiles de cuisine avant de vaporiser. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains après usage. Ne pas faire geler. Ne pas utiliser sur les adiantes. Ne pas employer pour fruits et légumes.

**PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour enlever toute la pression. Mettre le contenant avec les ordures ménagères. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )