

2014-0976
2014-04-25

KONK^{MD}

407

INSECTICIDE AVEC PYRÉTHRINE

VAPORISATEUR SOUS PRESSION COMMERCIAL

TUE: Les mouches, moustiques, guêpes, moucheron, blattes, fourmis, grillons, anthrères de tapis, myriapodes, millipèdes, cloportes communs, araignées, lépismes argentés, pyrales indiennes de la farine, alucites des grains, triboliums bruns de la farine, cucujides dentelés des grains, calandres des grains, charançons du riz, triboliums rouges de la farine, papillons nocturnes, cirons de la farine, punaises des lits et puces.

POUR EMPLOI DANS : Les industries d'emballage d'alimentation, industries d'emballage de viande, industries d'alimentation, industries d'emmagasiner de nourriture, véhicules de transport de nourriture, cuisines institutionnelles ou commerciales, salles à manger et dépenses de restaurants, supermarchés, industries d'embouteillage, hôpitaux, hôtels, motels, logements, magasins, logements pour personnes âgées, garderies, terrains de camping, autobus, trains et navires.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI GARANTIE

Pyréthrine	1,00%
Butoxide de pipéronyle, technique	2,00%
Dicarboximide de bicycloheptène N-octylique	3,33%

NO. D'ENREGISTREMENT 24875 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

EXPLOSIF Contenu net 454 g

Acuity Holdings, Inc.
125 Buttermilk Ave.
Concord, ON L4K 3X5
905-669-9876

MODE D'EMPLOI : Tenir le contenant à la verticale en vaporisant. Garder le vaporisateur à au moins 1 m des murs, tissus et meubles. Balayer et détruire les insectes morts si possible.

INSECTES VOLANTS : Les mouches, moustiques, papillons nocturnes, guêpes, moucheron - Calculer l'espace à traiter en mètres cubes. Fermer toutes les portes et fenêtres. Arrêter tous les systèmes d'aération. Empêcher les personnes et les animaux d'entrer dans la pièce à traiter. Diriger le jet à grands mouvements balayant dans toutes les parties de la pièce, surtout près des fenêtres et autres sources de lumière. Les insectes doivent être atteints par la buée pour être tués. Quand possible, diriger la buée dans les endroits où les insectes sont présent. Vaporiser pour 2-3 secondes par 30 m³ d'espace. Répéter le traitement si nécessaire.

INSECTES RAMPANTS : Blattes, fourmis, araignées, lépismes argentés - Ouvrir tous les cabinets, penderies et armoires. Vaporiser directement sur les insectes ou dans les fentes et fissures où les insectes se cachent.

POUR DES BLATTES : Pour de meilleurs résultats, vaporiser directement sur les blattes et vaporiser entièrement toutes les parties de la pièce et les endroits soupçonnés d'héberger ces insectes. Porter une attention particulière aux fentes, surfaces cachées, sous les éviers, derrière des poêles et réfrigérateurs, les dépenses de nourriture, et n'importe où ces insectes sont soupçonnés de se cacher. Aussi, vaporiser autour des cadres de fenêtres et portes. Répéter si nécessaire.

POUR LES ARAIGNÉES ET LÉPISMES ARGENTÉS : Pour le contrôle de ces insectes, une vaporisation fréquente et répétée sur les plinthes, fenêtres, cadres de portes, bibliothèques, et endroits d'emménagement devraient être faites. Pour le contrôle adéquat, vaporiser directement sur les insectes.

POUR LES GRILLONS : Vaporiser entièrement et fréquemment derrière des poêles, réfrigérateurs, sous des armoires, dans les dépenses, et surtout dans les penderies, sous-sols, et autres endroits humides. Pour de meilleurs résultats, vaporiser directement sur les insectes. **POUR LES FOURMIS :** Vaporiser les pistes de fourmis, les nids et points d'entrée pour 10-15 secondes par 9 m² de superficie de plancher.

POUR LES PYRALES INDIENNES DE LA FARINE ET ALUCITES DES GRAINS : Fermer les fenêtres et les portes. Diriger le jet de vaporisation dans toutes les parties de la pièce surtout autour des récipients emmagasinés de produits alimentaires, palettes et superficies sombres. Vaporiser 7 à 10 secondes pour chaque 30 m³ d'espace. Garder la pièce fermée pour 15 minutes suivant le traitement. Répéter le traitement au besoin ou si nécessaire.

POUR LES ANTHRÈNES DE TAPIS : Vaporiser directement les anthrènes sur les plinthes, planchers, étagères et tapis. Répéter le traitement si nécessaire.

POUR LES TRIBOLIUMS BRUNS DE LA FARINE, CUCUJIDES DENTELÉS DES GRAINS, CALANDRES DES GRAINS, CHARANÇONS DU RIZ, TRIBOLIUMS ROUGES DE LA FARINE, CIRONS DE LA FARINE : Vaporiser les fentes et fissures, les machines de manutention et de traitement, autour des cartons ou contenants et autres superficies où ces insectes se rassemblent. Vaporiser 30 secondes pour chaque 9 m² de surface. Garder la pièce fermée pour 45 minutes à 1 heure après le traitement. Répéter le traitement si nécessaire.

POUR LES PUNAISES DES LITS : Vaporiser les matelas, particulièrement autour des touffes et coutures. Défaire les lits et vaporiser tous les coins. Traiter les plinthes, moulures et planchers. Répéter le traitement si nécessaire.

POUR LES PUCES : Vaporiser les lits, literie, plancher et endroits où les animaux habitent. Répéter au besoin. Ne pas employer directement sur les animaux.

LE TRAITEMENT POUR DES ESPACES INACCESSIBLES (greniers, faux plafonds, murs et vides dans les machines): Pour des scènes exposées de blattes, araignées, fourmis, lépismes argentés, grillons, myriapodes, millipèdes, cloportes communs et triboliums - Calculer l'espace vide et traiter à un taux de 20 secondes par 30 m³ (pour récipient de 6,8 kg - 10 secondes par 30 m³). Vaporiser en plaçant la tige d'injection dans la fente ou fissure, trou ou autre petite ouverture dans un espace vide. Répéter le traitement si nécessaire. S'assurer d'une bonne circulation d'air après avoir traité les pièces.

REMARQUE À L'APPLICATEUR : Pendant tout traitement volumétrique, porter un respirateur approuvé pour les pesticides.

APPLICATION À L'EXTÉRIEUR : Pour tuer les puces, moustiques et moucheron dans des espaces ouverts près des édifices et dans les terrains de camping, les meilleurs résultats sont obtenus quand la température est 24°C ou moins, et s'il y a un vent de 8 km/h ou moins. Vaporiser au rythme de 60 à 80 secondes par 0,4 hectare (pour récipient de 6,8 kg, vaporiser 30 à 40 secondes par 0,4 hectare). Vaporiser à grands jets à travers la superficie à être traitée. Répéter le traitement si nécessaire.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Éviter de respirer la buée de vaporisation ou les vapeurs. Ne pas rester dans les lieux traités. Éviter le contact avec la peau ou les yeux. Dans les industries de préparation de viande et de nourriture, traiter seulement après les heures de travail. Aucun produit d'emballage, viande ou aucun ingrédient doit être dans la pièce. Couvrir tout équipement de préparation de nourriture. Toutes surfaces traitées qui peuvent entrer en contact avec la viande, la nourriture ou autres produits de nourriture doivent être lavées et rincées entièrement avec l'eau potable, après le traitement et avant de le réutiliser. Ne pas utiliser dans les garderies, les pièces où les enfants, personnes âgées ou malades sont soignés. Pour vaporiser les dépenses ou armoires de nourriture, enlever la nourriture des étagères. Vaporiser entièrement et replacer la nourriture. Dans le logement, toutes surfaces en contact avec la nourriture et les ustensiles doivent être couverts pendant le traitement, ou lavés entièrement avant d'utiliser.

CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas percer ou incinérer le contenant. Ne pas employer ou conserver près de la chaleur ou flamme ouverte. Conserver à des températures de plus de 50°C peut causer le contenant d'éclater. Ne pas vaporiser sur des surfaces vernies, peintes ou en plastique ou directement sur l'équipement électronique tel que radio, télévision, ordinateur, etc. Enlever les animaux domestiques, les oiseaux, et recouvrir les aquariums avant de vaporiser.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un

médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.