2024-2958
2025-02-07

PIÈGE À MOUCHES DES FRUITS ONGUARD

Contient du vinaigre de cidre de pomme de qualité alimentaire

Solution

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : Acide acétique .....5,12 %

DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX
ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU

Nº D'HOM. 35381 LPA

CONTENU NET : 20 mL

UR-CAN INC.
PO Box 20069 Brant Hills
Burlington ON L7P 0A4
1 888 484-3213

MISES EN GARDE :

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
CORROSIF pour les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Provoque une irritation des voies respiratoires. Éviter d'inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

Ne pas entreposer dans des endroits accessibles aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux domestiques.

PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Traiter selon les symptômes.

Pour attirer et piéger les mouches des fruits.

MODE D'EMPLOI

1. Presser doucement le piège et décoller la languette en plastique blanc.
2. Recycler les pièges vides ou les jeter.

INSTALLATION
Installer le piège sur un comptoir, une table, un rebord de fenêtre ou une autre surface stable près de l'infestation de mouches des fruits. Si plusieurs pièges sont utilisés, les installer à 1,8 m (6 pi) les uns des autres.

Les mouches des fruits peuvent se reproduire dans les garde-mangers, les poubelles de cuisine, les éviers, les broyeurs de déchets et les bacs de compostage – partout où des fruits, des légumes

et des restes de nourriture se trouvent. Ces endroits constituent d'excellents emplacements pour le piège. Pour augmenter l'attrait de l'appât dans le piège, éliminer toutes les sources alternatives de nourriture ou empêcher les mouches des fruits d'y avoir accès, dans la mesure du possible.

ENTREPOSAGE : Conserver dans le récipient d'origine, dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Mettre le récipient à la poubelle lorsqu'il est vide.