

2014-0976  
2014-04-25

## INSECTICIDE KONK TOO Pour Bestiaux et installations laitières

Émulsion sous pression, à base d'eau

Un insecticide concentré pour usage sur les vaches (laitières ou non), bœufs, les chevaux, porcs et autres bestiaux décrit dans cette étiquette.

**Utilisation** chez les quarts, les salles de lait, les granges de laiterie, les granges de cheval, les porcheries, les maisons de volaille, et les hangars animaux d'abri.

### Tue et éloigne

Les mouches piquantes des étables taons, mouches faciales, mouches de chevreuil, mouches domestiques, mouches des cornes, moustiques, brûlots, guêpes, phalènes de nuit, et les insectes rampants tels que les blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes de tapis, centipèdes, lépismes argentés, puces des chats et chiens, tiques sanguines, tiques américaines des chiens et punaises des lits.

À USAGE AGRICOLE

### GARANTIE

Pyréthrine ..... 0,50%  
Butoxide de pipéronyle ..... 4,00%

Contient un insecticide provenant de la fleur du chrysanthème.

ATTENTION



INFLAMMABLE



EXPLOSIF

NO D'HOMOLOGATION 24436 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

Acuity Holdings, Inc.  
125 Buttermill Ave.  
Concord, ON L4K 3X5  
905-669-9876

CONTENU NET 500-680g

## MODE D'EMPLOI

**BESTIAUX :** Pour traiter les boeufs et les vaches (laitières ou non), les chevaux, porcs et autres bestiaux contre les mouches piquantes des étables, taons, mouches faciales, mouches de chevreuil, mouches domestiques, mouches des cornes, moustiques et brûlots. Vaporiser les animaux une fois par jour d'une fine pellicule. Appliquer l'insecticide pour 6 à 8 secondes par animal. Couvrir seulement le bout des poils d'une fine pellicule - ne pas mouiller la peau ni imbiber le poil. Ne pas vaporiser les yeux ou la bouche de l'animal. Appliquer l'insecticide au moins 20 minutes avant la traite. Laver les mamelles et les pis de la vache avant la traite. Ne pas couvrir un cheval après l'application.

**VAPORISATEUR POUR BESTIAUX ( dans les laiteries, les granges et les étables, les chevaux dans les écuries, les porcs dans les porcheries, et les abris d'animaux) :** Appliquez à un taux de 6 à 10 secondes par 30 m<sup>3</sup>. Dirigez la brume vers le haut dans un mouvement rapide vers le plafond et les coins supérieurs de la sale et ne pas orienter sur des animaux ou des oiseaux. Pour meilleurs résultats, fermez toutes les portes et fenêtres pendant le traitement de la pièce pendant 15 minutes. Aérez les secteurs complètement pendant au moins 30 minutes avant réentrée. Répétez selon les besoins. Nettoyez les insectes morts. **DANS LES LAITERIES** les animaux dans les laiteries doit être enlevés avant de vaporiser. Couvrir ou enlever le lait et les trayeuses avant de vaporiser. Après l'application, laver soigneusement les surfaces qui peut entrer en contact avec le lait et faite un rinçage complète avec de l'eau potable avant de reprendre le travail. Dans les abris d'animaux, l'application peu être influencé par les espaces et les courants d'air.

**DANS LES POULLAILLERS ET LES VOTAILLES :** Pour contrôler les puces et les étapes exposées de Coléoptères Sombres, vaporiser complètement les perchoirs, les murs, les nids ou les cages. Ceci devrait être suivi de la pulvérisation au-dessus des oiseaux avec une brume fine. Répétez selon les besoins. Pour le contrôle des punaises des lits et les mites sur les volailles et leur étables, vaporiser les crevasses des poteaux de perchoir, fissures dans des murs et fissures dans les nids où les punaises et les mites se cachent. Ceci devrait être suivi de la pulvérisation au-dessus des oiseaux avec une brume fine. Répétition selon les besoins.

**INSECTES RAMPANTS :** Vaporiser les abris d'insectes tels que les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, tuyaux et canalisations sanitaires, derrière les comptoirs et les armoires. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Vaporiser les sentiers de fourmis, autour des cadres de portes et fenêtres ainsi que les fourmilières. **PUNAISES** - Vaporiser le matelas, surtout autour des coutures et des ganses. Défaire le lit et vaporiser tous les coins du lit, le cadre de lit et les ressorts. Répéter au besoin. **PUCES** - Vaporiser les endroits infestés dont le lit des animaux domestiques, leurs endroits fréquentés, leurs places de repos, les fentes et fissures proches, le long des plinthes, autour des cadres de portes et de fenêtres, les endroits sur le plancher où les puces ont vécu. Enlever la literie et remplacer avec de la literie fraîche, propre, après l'application. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Ne pas traiter les animaux domestiques avec ce produit.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Évacuer les endroits traités. Bien aérer après l'application. Dans les hôpitaux, ne pas utiliser dans les chambres et les endroits où les enfants, les bébés, les personnes âgées ou les malades sont soignés. Couvrir le lait et les accessoires de traite pour éviter la contamination par le vaporisateur et les insectes tués. (Nettoyer soigneusement toutes les surfaces qui peuvent entrer en contact avec la nourriture pour les animaux ou les humains et rincer à l'eau claire après l'application et avant de réutiliser.) Ne pas contaminer les cours d'eau et les conduits d'eau ou de nourriture pour les animaux ou les humains. Éviter de respirer la vapeur. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Laver après l'application.

**CONTENU SOUS PRESSION.** Ne pas placer dans l'eau chaude, près d'un radiateur, poêle ou autre source de chaleur. Ne pas percer ni jeter au feu, ni conserver à des températures de plus de 50°C. Ne pas vaporiser près d'une flamme vive, des étincelles ou en fumant.

**PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.