

2025-0403
2025-10-24

DESTRUCTEUR D'INSECTES PRO-PERM OnGuard

**SOLUTION À BASE D'EAU
AUCUNE DILUTION REQUISE**

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

Perméthrine 0,35 %

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,1 % à titre d'agent de conservation.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

ACTION RAPIDE RÉSIDUELLE (24/7)

**TUE LES BLATTES ET PROCURE UNE ACTION CONTINUE PENDANT 60 JOURS
EFFET DE LONGUE DURÉE CONTRE LES PUCES, LES TIQUES SANGUINES ET LES ARAIGNÉES**

CONTIENT DES ARÔMES DE D-LIMONÈNE ET DE CITRONNELLE

ININFLAMMABLE

N° D'HOM. 32333 LPA

CONTENU NET : 100 mL à 4 L

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

**UR-CAN INC.
PO Box 20069 Brant Hills
Burlington ON L7P 0A4
888 484-3213**

2025-0403

2025-10-24

POUR SUPPRIMER LES FOURMIS, LES PUces, LES TIQUES SANGUINES, LES ANTHRÈNES DES TAPIS, LES MITES (TEIGNES), LES BLATTES, LES GRILLONS, LES PERCE-OREILLES, LES THERMOBIES, LES MOUCHES DOMESTIQUES, LES TRIBOLIUMS ROUGES DE LA FARINE, LES CHARANÇONS DU RIZ, LES LÉPISMES ARGENTÉS, LES CLOPORTES, LES ARAIGNÉES, ET LES PUCERONS ET LES ALEURODES SUR LES PLANTES D'INTÉRIEUR. TUE AUSSI LES PUNAISES DES LITS.

MODE D'EMPLOI : Pour application localisée ou dans les fissures et les crevasses seulement. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance ou en application généralisée. Appliquer avec un pulvérisateur à pompe sous pression (vendu séparément). Régler la buse pour obtenir le type de pulvérisation désiré. Appliquer directement sur les ravageurs, si possible. Si les ravageurs persistent, répéter l'application au besoin.

NE PAS appliquer sur un plan d'eau.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR :

LES FOURMIS, LES BLATTES, LES GRILLONS, LES PERCE-OREILLES, LES THERMOBIES, LES LÉPISMES ARGENTÉS, LES CLOPORTES, LES ARAIGNÉES, LES TRIBOLIUMS ROUGES DE LA FARINE ET LES CHARANÇONS DU RIZ : Diriger le jet dans les fissures, les crevasses, derrière les étagères et les commodes, dans tous les endroits où les insectes pourraient se cacher. Pour les fourmis, les blattes, les lépismes argentés, les cloportes et les araignées, appliquer aussi le produit sur les seuils des portes, le long des plinthes, sur les ouvertures autour des éviers, des drains et des tuyaux, derrière la cuisinière et le réfrigérateur, autour du cadre des fenêtres, dans des zones localisées des greniers et des sous-sols et autour des bases de fondations internes. Pour les lépismes argentés, appliquer aussi le produit sur les bibliothèques. Pour les fourmis, appliquer aussi le produit sur les points d'entrée, les nids et les sentiers de fourmis. **LES ANTHRÈNES DES TAPIS :** Pulvériser du produit sur les bords des tapis et sous les tapis pendant environ 10 secondes. Faire des applications localisées du produit sur le plancher et les plinthes. Pulvériser directement dans les fissures, les crevasses et toutes les zones infestées sur les étagères. **LES PUces (ADULTES ET LARVES) ET LES TIQUES SANGUINES (ADULTES ET NYMPHES) :** Pulvériser généreusement les zones infestées, les lits des animaux, les espaces de repos, les fissures et crevasses à proximité, le long et derrière les plinthes, les moulures et les cadres de fenêtres et de portes. De la literie propre devrait être placée dans les espaces de repos des animaux après le traitement. Permettre au produit de sécher complètement avant de permettre aux animaux d'entrer en contact avec les zones traitées. **LES PUNAISES DES LITS :** Pulvériser directement dans les fissures et les crevasses où les ravageurs se trouvent ou pourraient se cacher; le long et derrière les plinthes, les moulures et le plancher sous les objets comme les lits et les tables de nuit. Pulvériser directement sur l'insecte si possible. **LES MITES (TEIGNES) :** Enlever tous les articles infestés de leur lieu d'entreposage, les brosser méthodiquement et les laisser airer au soleil pendant plusieurs heures, si possible. Appliquer le produit dans les coffres, les garde-robés, les commodes et tous les espaces de rangement vides en dirigeant le jet dans les fissures, les crevasses et les joints. Suite à l'aération des articles, ils peuvent être légèrement traités avec le produit en gardant la buse du contenant à au moins 90 centimètres (3 pieds) du tissu pour éviter la formation de taches. Attendre que les articles sèchent avant de les manipuler et bien les laver avant de les porter. **LES MOUCHES DOMESTIQUES :** Faire des applications localisées seulement. Pulvériser à l'intérieur autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent.

POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR :

LES FOURMIS, LES GRILLONS, LES PUces, LES ARAIGNÉES, LES CLOPORTES ET LES TIQUES SANGUINES : Appliquer le produit sur les surfaces extérieures des moustiquaires, des portes, des cadres de fenêtres, des fondations, dans et sous les gouttières, les patios, les lumières et tous les autres endroits où les insectes pourraient se rassembler sur les structures ou y pénétrer. **LES MOUCHES DOMESTIQUES :** Faire des applications localisées seulement. Pulvériser à l'extérieur autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent. Les revêtements en vinyle ou en aluminium : L'utilisation de ce produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, a pris de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toutes autres façons) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil, peuvent favoriser la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser le produit sur les revêtements en vinyle ou en

2025-0403

2025-10-24

aluminium, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer si le produit risque de tacher. Peu importe les résultats du test, ne pas appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium lorsque la surface est directement exposée au soleil ou pendant la chaleur du jour.

POUR LES PLANTES D'INTÉRIEUR :

LES PUCERONS ET LES ALEURODES : Pulvériser le produit sur le dessus et le dessous des feuilles des plantes jusqu'à ce qu'elles soient humides, mais pas jusqu'au point de ruissellement. Le produit est sans danger pour la plupart des plantes. Avant de traiter des plantes délicates, appliquer du produit sur une ou deux feuilles seulement et attendre deux jours pour s'assurer que les feuilles ne seront pas endommagées par le produit.

LIMITATIONS : NE PAS UTILISER sur les humains ou les animaux. L'utilisation de ce produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, a pris de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toutes autres façons) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil, peuvent favoriser la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser le produit sur les revêtements en vinyle ou en aluminium, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer si le produit risque de tacher. Peu importe les résultats du test, ne pas appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium lorsque la surface est directement exposée au soleil ou pendant la chaleur du jour. Ne pas appliquer sur des tapisseries, du papier peint ou des matériaux similaires qui peuvent être tachés. Pour toutes les autres surfaces à traiter, effectuer un test avec le produit sur une petite surface discrète pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur avant d'appliquer le produit en grande quantité.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER COMME PULVÉRISATION D'AMBIANCE. Ne pas utiliser dans les endroits où de la nourriture est manipulée, préparée ou entreposée. Se laver soigneusement après la manipulation et avant de fumer ou de manger. Avant de traiter les surfaces, retirer les animaux de compagnie et les oiseaux, et couvrir les aquariums. Après l'utilisation et après au moins une heure de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact avec de la nourriture. Ne pas utiliser sur les humains ou les animaux. Ne pas laisser les personnes ni les animaux de compagnie entrer en contact avec les surfaces traitées tant que celles-ci ne seront pas sèches. Ce produit est extrêmement toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : NE PAS réutiliser le contenant vide. Recycler le contenant vide si disponible, ou le jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale, territoriale, ou municipale.

MODE D'EMPLOI POUR LE PULVÉRISATEUR :

Appliquer avec un pulvérisateur à pompe sous pression (vendu séparément).

2025-0403

2025-10-24

Régler la buse au type de pulvérisation désiré et activer la gâchette pour appliquer.

ENTREPOSAGE : Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du pulvérisateur.