

2024-5147, 2024-11-12

KNOCK DOWN PRO 153 RTU MULTI SITE/MULTI ZONE INSECTICIDE

DOMESTIQUE

Pour usage domestique à l'intérieur et à l'extérieur
Insecticide à emulsion stable prêt à l'emploi de Permanone

Ce produit doit être utilisé pour supprimer les organismes nuisibles indiqués à l'intérieur des bâtiments: les blattes, les cloportes, les fourmis, les lépismes (argenté), les thermobies, les araignées, les grillons, tribolium rouge de la farine, charançon du riz, les anthrènes des tapis, les mites, les puces, les tiques sanguines, les mouches domestiques, les punaises des lits et les perce-oreilles

Ce produit doit être utilisé pour supprimer les organismes nuisibles indiqués pour les utilisations extérieures générales indiquées en milieu résidentiel: les fourmis des trottoirs et les tiques sanguines

PRINCIPE ACTIF: Perméthrine.....0,25%

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,20% à titre d'agent de conservation OU
Contient du benzoate de sodium à raison de 0,60% à titre d'agent de conservation OU
Contient du benzoate de sodium à raison de 0,80% à titre d'agent de conservation OU
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193% à titre d'agent de conservation

NO. D'HOMO. 31247 L.P.A.
CONTENU NET: ml

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION POISON

KUUS INC. Les produits du famille avec valeur ajoutée™
UNITÉ 5 & 6, 450 TAPSCOTT RD,
Toronto, ON M1B 1Y4
1-800-267-0455

Fièrement fabriqué au Canada
www.knockdownbugs.com www.mosquitoshield.com
Fabricants de Chasses Moustiques Mosquito Shield

2024-5147, 2024-11-12

MODE D'EMPLOI

Renseignements Généraux: La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés.

KNOCK DOWN PRO 153 RTU MULTI SITE/MULTI ZONE INSECTICIDE est prêt à l'emploi. Dans la zone d'application, pour améliorer l'efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l'organisme nuisible ciblé, dans la mesure du possible.

Restrictions: NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets. Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents. NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité. Sauf indication contraire sur cette étiquette, NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires). Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air. NE PAS appliquer dans des zones où sont cultivées des plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes). NE PAS appliquer sur des plantes destinées à la consommation humaine ou animale (par exemple, fruits, légumes, fines herbes).

Si on applique le produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), il risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. De plus, l'ensoleillement direct et la chaleur extrême peuvent favoriser les dommages. Avant l'application, traiter une petite surface du bardage et vérifier s'il y a des taches 30 minutes plus tard. Quels que soient les résultats de l'essai, ne pas appliquer ce produit sur un tel bardage quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour. Cet insecticide peut tacher ou endommager certains matériaux à base de plastique, de caoutchouc ou d'asphalte tels que les carreaux, les couvre-planchers et les tapis. Appliquer prudemment sur les surfaces indiquées, en évitant tout mouillage excessif. Ne pas utiliser sur les tentures, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher. Ne pas utiliser sur les rideaux, papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher. Pour toute autre surface, traiter une petite zone peu apparente pour vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches avant de procéder à l'application complète.

Comment Appliquer: NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé. Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou d'un traitement localisé. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

Instructions concernant l'application à l'intérieur des bâtiments:

Pour supprimer les fourmis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les thermobies, les lépismes argentés, les cloportes, les araignées, les triboliums rouges de la farine et les charançons du riz: Traiter à fond les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d'eau; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de couvre-planchers; et aux points d'entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes). Dans le cas des lépismes argentés,

2024-5147, 2024-11-12

pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Avant le traitement, retirer tous les objets des bibliothèques où des livres, des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets sont entreposés. Attendre que les bibliothèques traitées aient séché avant d'y replacer les objets après le traitement. Dans le cas des fourmis, pulvériser aussi les pistes et les nids. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les anthrènes des tapis: Pulvériser sur le bord des tapis et sous les tapis et les moquettes pendant environ 10 secondes. Traiter des parties localisées des planchers et des plinthes; pulvériser directement dans les fissures, les crevasses et les endroits infestés des rayonnages. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les teignes des vêtements: Retirer tous les objets des bibliothèques, des garde-robes et des autres meubles de rangement où des vêtements, des jouets, des serviettes et d'autres objets pourraient être entreposés. Retirer tous les articles infestés de leur lieu d'entreposage, les brosser à fond, puis les aérer pendant plusieurs heures à la lumière du soleil si possible. Pulvériser dans les coffres, les garde-robes, les bureaux et les autres unités de rangement vides en dirigeant le jet dans les fissures, les joints et les crevasses. Attendre que les meubles traités aient séché avant d'y replacer les objets après le traitement. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les mouches domestiques: Traitement localisé seulement. Pulvériser le produit sur les surfaces internes des bâtiments autour des points d'entrée (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre), autour des luminaires et sur des parties localisées des murs, des planchers et des plafonds. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les puces (adultes et larves) et les tiques sanguines du chien (adultes et nymphes): NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs et des planchers, le long des plinthes et en arrière de celles-ci, sur les cadres de fenêtre et de porte, et sur des parties localisées de planchers et de couvre-planchers. La literie des animaux de compagnie peut être traitée avec ce produit ou être remplacée par une literie fraîche et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l'étiquette. NE PAS pulvériser ce produit sur les animaux de compagnie. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d'animal de compagnie en question. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques à l'intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend le nettoyage à l'aspirateur des sols, des tapis, des meubles (jeter le sac de l'aspirateur après l'emploi) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux adjacents. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Pour supprimer les punaises des lits: NE PAS appliquer sur les matelas, les têtes et pieds de lit ou les meubles. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long des plinthes et des moulures et en arrière de celles-ci; et sur des parties localisées des murs et des planchers en arrière des meubles (p. ex. lits, tables de chevet). Pour accroître l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les punaises des lits dans la mesure du possible. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Traitement généralisé à l'extérieur:

Suppression des tiques sanguines à l'extérieur: Pour supprimer les tiques sanguines dans les aires d'activités extérieures, traiter une bande de végétation et une couverture de feuilles mortes d'une largeur de 1,8 à 3 mètres (6 à 10 pieds) le long des aires d'activités, particulièrement dans les zones de végétation dense. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

Suppression des fourmis: Pour le traitement localisé des infestations limitées dans les zones non cultivées, pulvériser à fond les zones infestées. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît. Dans le cas des fourmis (des trottoirs), appliquer directement sur les fourmilières. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

2024-5147, 2024-11-12

MODE D'EMPLOI POUR LE VAPORISATEUR

Régler la buse du pulvérisateur de façon à obtenir un jet pour traiter les fentes et les crevasses ou une pulvérisation à grosses gouttes pour les autres endroits à traiter. Tenir le pulvérisateur à une distance de 30 cm (12 pouces) des insectes à éliminer ou des surfaces à traiter. **Entreposage:** Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du pulvérisateur. Conserver en lieu sûr dans le contenant d'origine. Craint le gel. Ne pas transvider le produit dans un autre contenant.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Se laver les mains à fond après avoir manipulé le produit et avant de fumer ou de manger. Éviter de contaminer les aliments pour humains, les aliments pour animaux, les ustensiles de cuisine et l'eau potable. Tenir les animaux de compagnie à l'écart et couvrir les aquariums avant d'appliquer le produit. Après l'emploi et au moins une heure (1) de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact avec des aliments. Ne pas utiliser le produit sur les humains.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les insectes utiles.

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.